

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Bobi Star bolha- és kullancsirtó piros nyakörv kutyák részére A.U.V.

#### 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Fortevit Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Primavet Produkt Kft.-t (H-1108 Budapest, Gumigyár utca 5-7.)

#### 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Bobi Star bolha- és kullancsirtó piros nyakörv kutyák részére A.U.V.

Permetrin (cisz:transz 25:75)

Tetrametrin

#### 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Egy 20 grammos nyakörv tartalmaz:

**Hatóanyagok:**

Permetrin (cisz:transz 25:75) 0,48 g

Tetrametrin 0,12 g

**Adjuváns:**

Piperonil-butoxid 0,60 g

#### 4. JAVALLAT(OK)

Kutyák bolha (*Ctenocephalides canis* és *Ctenocephalides felis*), valamint kullancs (*Ixodes ricinus* és *Dermacentor reticulatus*) fertőzőtsége ellen.

Folyamatos használata 12 hetes védelmet nyújt a bolhák és kullancsok ellen.

#### 5. ELLENJAVALLATOK

Macskákon nem alkalmazható.

Nem alkalmazható májbeteg állatokon vagy májkárosodás esetén.

Nem alkalmazható beteg, betegségre gyanús, lábadozó állatokon, valamint bőrsérülések esetén.

Nem alkalmazható vemhes és szoptató szukákon, valamint 12 hetesnél fiatalabb kutyakölykökön.

Nem alkalmazható szintetikus piretroidokra ismertén túlérzékeny kutyákon.

#### 6. MELLÉKHATÁSOK

Ritkán bőrirritáció előfordulhat. A nyakörvet azonnal el kell távolítani, és állatorvoshoz kell fordulni, ha bőrirritáció vagy egyéb nem kívánatos hatás jelentkezik.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

#### 7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Kutya.

#### 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Alkalmazás módja: Kizárólag külsőleg.

#### 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A Bobi Star bolha-, és kullancsirtó piros nyakörv kutyák részére A.U.V. nagy és átlagos testméretű kutyáknak készült.

Közvetlenül a felhasználás előtt bontsuk ki a becsomagolt nyakörvet.

Kissé lazán helyezzük a kutya nyaka köré és úgy kapcsoljuk be a csattal, hogy két ujjunk a nyak és a nyakörv közé beférjen. A feleslegesen maradt részt vágjuk le. A készítmény folyamatos viselés esetén 12 hétig hatékony bolhák és kullancsok ellen. A nyakörv víz hatására sem veszíti el a hatékonyságát.

## 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Nem értelmezhető.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

25 °C alatt tárolandó. Közvetlen hőtől és napfénytől védve tartandó.

A nyakörvet a felhasználásáig az eredeti, bontatlan csomagolásban kell tartani.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

## 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan

Az újrafertőződés megakadályozása céljából, valamint erős bolhafertőzöttség esetén az optimális védelem érdekében az állat környezetét is érdemes megfelelő inszekticid készítménnyel kezelni.

A hatóanyagok különösen mérgezőek a halakra és a vízi szervezetekre, ezért a nyakörv felhelyezése után nem szabad úszni engedni a kutyákat, vagy úsztatás előtt mindenképpen le kell venni a nyakörvet.

Meg kell akadályozni, hogy a kutya nyaldossa vagy rágcsálja a nyakörvet.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

Azonnal el kell távolítani a nyakörvet, ha mellékhatások lépnek fel a nyakörv felhelyezése után.

A nyakörv szorosságát ellenőrizni kell.

Egy állatra egyidejűleg csak egy gyógyszeres nyakörv helyezhető fel.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A nyakörv felhelyezése és érintése után alaposan kezét kell mosni szappanos vízzel.

A készítmény felhelyezésével egyidejűleg nem szabad dohányozni, enni és inni.

A gyermekeket ne játszanak a nyakörvvel.

Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás

Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt a célállat fajon vemhesség és laktáció idején, ezért adatok hiányában a termék alkalmazása vemhesség és laktáció alatt nem javasolt.

Gyógyszerköölcsönhatások és egyéb interakciók

Más ektoparazita ellenes készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

Inkompatibilitások

Nem ismert.

**Környezeti tulajdonságok**

A nyakörv hatóanyagai rendkívül mérgező hatásúak a méhekre, a halakra és más vízi élőlényekre.

## 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A készítmény és a kiürült csomagolóanyag nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

## 14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2023. június 14.

## 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Állatorvosi vény nélkül kiadható állatgyógyászati készítmény.

Szabadon forgalmazható.